



ALTELA®

POUŽITIE V ZÁHRADÁCH A PREDZÁHRADKÁCH JE POVOLENÉ

Pomocný prípravok na zvýšenie odolnosti proti chorobám a podporu zdravotného stavu rastlín.

AKTÍVNA ZLOŽKA:	extrakt z produktu fermentácie <i>Lacotobacillus</i> sp. suchý extrakt z juky suchý	4,2 % hm. (42 g/l) 1 % hm. (10 g/l)
Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku:	nerelevantné	
Označenie	 Nebezpečenstvo	
H302	Škodlivý po požití.	
H318	Spôsobuje vážne poškodenie očí.	
H411	Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.	
P102	Uchovávať mimo dosahu detí.	
P264	Po manipulácii starostlivo umyte ruky a tvár vlažnou vodou a mydlom.	
P270	Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.	
P280	Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.	
P301+P312	PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM /lekára.	
P305+P351+P338	Po ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.	
P330	Vypláchnite ústa.	
P501	Zneškodnite obsah/nádobu na skládku nebezpečného odpadu alebo odovzdajte na likvidáciu subjektu, ktorý má oprávnenie na zber, recykláciu a zneškodňovanie prázdnych obalov v súlade s platným zákonom o odpadoch.	
EUH401	Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.	

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie!

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Uložte mimo dosahu zvierat!

V kombinácii s prípravkom na ochranu rastlín sa uplatňuje prísnejšia klasifikácia!

VŠEOBECNÉ OPATRENIA NA PREDCHÁDZANIE ZDRAVOTNÉHO RIZIKA SÚVISIACE S POUŽÍVANÍM PRÍPRAVKOV NA OCHRANU RASTLÍN V ZÁHRADÁCH A V OBYTNÝCH ZÓNAH:

- používať predpísané osobné ochranné prostriedky a dodržiavať opatrenia na predchádzanie rizika ohrozenia zdravia iných osôb
- neprofesionálny používateľ je povinný zaobchádzať s prípravkom bezpečne v súlade s postupom uvedeným na etike
- postrek vykonávať výlučne pri bezvetří, alebo pri miernom vánku po smere vetra
- zabrániť priamemu kontaktu postreku s inými osobami
- zabrániť úletu postreku na susedné pozemky a zamedziť kontaminácii necieľových porastov, trávnikov a iných plôch, najmä s ohľadom na expozíciu rizikových skupín ako sú deti, tehotné a dojčiace ženy, starí a chorí ľudia
- trvanie práce s postrekom nesmie presiahnuť pol hodinu počas jedného dňa
- do ošetrovaných porastov vstupovať najskôr na druhý deň po aplikácii postreku

Držiteľ autorizácie:	BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o. Mayerova 784, 664 42 Modřice, Česká republika
Distribútor pre SR:	BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o. Mayerova 784, 664 42 Modřice, Česká republika
Číslo autorizácie ÚKSÚP:	22-01267-PM
Dátum výroby:	uvedené na obale
Číslo výrobnnej šarže:	uvedené na obale
Balenie:	20 ml, 25 ml, 50 ml a 100 ml HDPE fľaša

PÔSOBNIE POMOCNÉHO PRÍPRAVKU:

ALTELA je kontaktný prípravok, ktorý zastavuje vývoj hubových a bakteriálnych chorôb. Obsahuje prírodné enzýmy, polyketidy, neživé baktérie, rastlinné extrakty a niektoré stopové prvky ako je mangán a zinok. Ide o významné mikroprvky pre metabolizmus viniča i ďalších rastlín.

NÁVOD NA POUŽITIE:

Plodina	Účel použitia	Dávka %/100m ²	OL	Poznámka
vinič	posilnenie odolnosti rastlín voči hubovým chorobám, podpora zdravotného stavu	0,25	AT	
vinič		0,3	AT	
ovocné stromy		0,3	AT	
zemiak		0,3	AT	
zelenina		0,25	AT	pole, skleníky
jahoda		0,25	AT	pole, skleníky

AT – ochranná lehota je daná odstupom medzi termínom aplikácie a zberom.

POKYNY PRE APLIKÁCIU

ALTELA pôsobí v období pri napadnutí plesňami alebo baktériami. Neaplikujte pri vysokých teplotách a za poludňajšieho slnečného svitu. ALTELA sa aplikuje postrekom, rosením.

Dávka 0,25% = 10 ml/100 m²

Dávka 0,3 % = 20 ml/100 m²

Vinič: Prípravok aplikujte v rastovom štádiu od plného kvitnutia až do začiatku vývoja plodu (BBCH 65-70). Vyššiu koncentráciu použite v rastovom štádiu od nasadzovania plodov (BBCH 71).

Dávka vody: 4 l/100m²; resp. 6 l/100 m² pri vyššej koncentrácii

Max. počet aplikácií 4x za rok; resp. 6x za rok pri vyššej koncentrácii

Interval medzi aplikáciami je 7–10 dní.

Ovocné stromy: Prípravok aplikujte v rastovom štádiu od začiatku kvitnutia (BBCH 61).

Dávka vody: 6 l/100 m²

Max. počet aplikácií 6x.

Interval medzi aplikáciami je 7–10 dní.

Zemiak: Prípravok aplikujte v rastovom štádiu, keď 50% rastlín je v riadku zapojených (BBCH 35).

Dávka vody: 6 l/100 m²

Max. počet aplikácií 8x.

Interval medzi aplikáciami je 7–10 dní.

Zelenina: Prípravok aplikujte v rastovom štádiu keď listová ružica dosiahla 50% z očakávanej veľkosti alebo hlavná stonka dosiahla 50% z očakávanej dĺžky (BBCH 45);

Dávka vody: 4 l/100m²

Max. počet aplikácií 4x.

Interval medzi aplikáciami je 7–10 dní.

Jahoda: Prípravok aplikujte v rastovom štádiu od začiatku vývoja plodov (BBCH 71).

Dávka vody: 4 l/100m²

max. počet aplikácií 4x.

Interval medzi aplikáciami je 7–10 dní.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMÝCH A NEPRIAMÝCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pri dodržaní pokynov uvedených na etikete nedochádza k prejavom fytotoxicity a nebola zistená odrodová citlivosť.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Pri dodržaní pokynov pre aplikáciu sa vznik rezistencie nepredpokladá. Dodržujte správny termín aplikácie a registrovanú dávku pomocného prípravku.

VPLYV NA ÚRODU

Pomocný prípravok nemá negatívny vplyv na úrodu.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Výsev/výsadba následných a náhradných plodín je bez obmedzenia.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Aplikácia pomocného prípravku nemá negatívny vplyv na užitočné a iné necieľové organizmy.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo pomocného prípravku rozmiešajte v nádobe postrekovača v polovičnom množstve vody pri súčasnom zapnutí miešadla. Doplňte na požadovaný objem. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Prázdny obal z tohto výrobku zneškodnite ako nebezpečný odpad. Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!


ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Po skončení aplikácie pomocného prípravku je potrebné vyprázdniť nádrž postrekovacieho zariadenia a celé zariadenie vypláchnuť čistou vodou. V prípade čistiacich prostriedkov postupujte podľa návodu na ich použitie.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri práci používajte ochranné pracovné pomôcky. Počas práce s prípravkom nejedzte, nepite a nefajčite!

Postrekujte len za bezvetria alebo pri miernom vánku, smerom po vetre od ďalších osôb. Počas práce s pomocným prípravkom a po skončení práce až do odloženia pracovného odevu a ďalších osobných ochranných pracovných prostriedkov a do dôkladného umytia nejedzte, nepite a nefajčite. Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. Po práci s pomocným prípravkom sa dôkladne umyte. Pracovný odev a osobné ochranné pracovné pomôcky pred ďalším použitím vyperte, resp. očistite. Po ukončení práce opustite ošetrované priestory. Opätovný vstup na ošetrovaný pozemok je možný až po zaschnutí postrekovej kvapaliny. Pri príprave aplikačnej kvapaliny ani pri postreku nepoužívajte kontaktné šošovky.



PRVÁ POMOC

Všeobecné pokyny:	V prípade, že sa objavia zdravotné problémy (napr. nevoľnosť, pretrvávajúce slzenie, začervenanie, pálenie očí a pod.), alebo v prípade iných ťažkostí kontaktujte lekára.
Pri nadýchaní:	Prerušzte prácu. Opustite ošetrovanú oblasť, alebo preneste postihnutého mimo ošetrovanú oblasť.
Pri zasiahnutí pokožky:	Odložte kontaminovaný/nasiaknutý odev. Zasiahnuté časti pokožky umyte teplou vodou a mydlom. Pokožku potom dobre opláchnite. Pri väčšej kontaminácii pokožky sa osprchujte.
Pri zasiahnutí očí:	Vypláchnite oči podobu aspoň 10-tich minút veľkým množstvom vlažnej čistej vody. Ak sú nasadené kontaktné šošovky a ak je to možné, vyberte ich. Kontaktné šošovky nie je možné opätovne použiť, zlikvidujte ich.
Pri náhodnom požití:	Vypláchnite ústa vodou, prípadne dajte postihnutému vypiť asi pohár (1/4 litra) vody. Nevyvolávajte zvracanie.

Pri vyhľadání lekárskeho ošetrovania informujte lekára o prípravku, s ktorým sa pracovalo, poskytnite mu informácie z etikety alebo karty bezpečnostných údajov a o poskytnutej prvej pomoci. Ďalší postup prvej pomoci (príp. následnú liečbu) je možné konzultovať s **Národným toxikologickým informačným centrom – Klinika pracovného lekárstva a toxikológie, Limbová 5, 833 05 Bratislava, tel.: +421/2/54 774 166.**

SKLADOVANIE

ALTELA sa uchováva v originálnom obale pri izbovej teplote, v suchých dobre vetraných miestnostiach. Pri skladovaní za uvedených podmienok (od +5 až do + 20 °C) zaručuje výrobca deklarovanú aktivitu výrobku po dobu 2 rokov. Pomocný prípravok nesmie zmrznúť.

ZNEŠKODNENIE OBALOV A ZVÝŠKOV

Vyprázdnený obal vymyte vodou a likvidujte ako ostatný odpad.

Nepoužitý prípravok v pôvodnom obale a prázdne obaly z prípravku odovzdajte v mieste zberu domového odpadu špeciálne vytvoreného pre tento účel (v rámci triedenia odpadov) príslušnou samosprávou (informujte sa u orgánu miestnej správy)! Obaly od prípravku sa nesmú znovu používať na akékoľvek iné účely!